

第1回漢方生薬ソムリエ(初級)試験 鑑定試験の解答

| 番号 | 形状 | 生薬名 | 漢字名 | 部位 | 原植物ラテン名 | 原植物科名(ラテン名) | 解説 |
|----|----|---------|-----|---------|-------------------------|---------------------|---|
| 1 | 刻み | ブクリョウ | 茯苓 | 菌核 | Polyporaceae | Poria cocos | 全体が白色できめ細かく均質 |
| 2 | 刻み | ゲンノショウコ | | 地上部 | Geraniaceae | Geranium thunbergii | 茎、葉を含み、軟毛が見える |
| 3 | 全形 | コウカ | 紅花 | 管状花 | Carthamus tinctorius | Compositae | 特異なおい、赤色の花冠と黄色の花柱およびおしべを伴う |
| 4 | 全形 | ハンゲ | 半夏 | 塊茎 | Pinellia ternata | Araceae | ややつぶれた球形で根や茎の跡であるくぼみがある |
| 5 | 全形 | タクシャ | 沢瀉 | 塊茎 | Alismataceae | Alisma orientale | 球形でうっすら輪帯がみえる |
| 6 | 全形 | ソウジュツ | 蒼朮 | 根茎 | Atractylodes lancea | Compositae | 特異なおい、オイデスモルヒネソールの白色結晶がみえる |
| 7 | 全形 | オウゴン | 黄芩 | 根 | Scutellaria baicalensis | Labiatae | 外面が黄褐色、内面が黄色の根 |
| 8 | 刻み | キキョウ | 桔梗 | 根 | Platycodon glandiflorum | Campanulaceae | ほとんど白色の根、しわや隙間がみえる |
| 9 | 全形 | サイシン | 細辛 | 根及び根茎 | Asiasarum sieboldii | Aristolochiaceae | 特異なおい、円柱形の根茎に細長い根が多数つく |
| 10 | 全形 | マクリ | 海人草 | 全藻 | Digenea simplex | Rodomelaceae | 黒褐色でひも状、剛毛状の小枝が密生 |
| 11 | 刻み | ニガキ | 苦木 | 木部 | Picrasma quassioides | Simaroubaceae | 淡黄色、においはなく、味は極めて苦い。同じ木部を使うソポクは黄赤色 |
| 12 | 刻み | モクツウ | 木通 | (つる状の)茎 | Akebia quinata | Lardizabalaceae | 灰白色から黄白色で、放射状の紋理と斑点状の太い道管がみえる。同じつるを使う防己は暗い褐色で菊状紋理が目立つ |
| 13 | 刻み | シャゼンソウ | 車前草 | (花期の)全草 | Plantago asiatica | Plangaginaceae | 穂状の花と、さじ状の葉が特徴 |
| 14 | 全形 | バクモンドウ | 麦門冬 | 根(の膨大部) | Ophiopogon japonicus | Liliaceae | 淡黄色で紡錘状 |
| 15 | 全形 | シュクシャ | 縮砂 | 種子(の塊) | Amomum xanthioides | Zingiberaceae | 暗褐色で外面は多数の突起がみえる |
| 16 | 末 | シャクヤク | 芍薬 | 根 | Paeonia lactiflora | Paeoniaceae | 特異なおい、淡黄色 |
| 17 | 全形 | マシニン | 麻子仁 | 果実 | Cannabis sativa | Moraceae | やや緑色を帯びた褐色、表面につやがある |
| 18 | 刻み | インチンコウ | 茵陳蒿 | 頭花 | Artemisia capillaris | Compositae | 黄緑色で細かい花穂の頭花 |
| 19 | 末 | オウバク | 黄柏 | 樹皮 | Phellodendron amurense | Rutaceae | 鮮やかな黄色で苦みが強い |
| 20 | 刻み | ボレイ | 牡蠣 | 貝がら | Ostrea gigas | Osteridae | 無味無臭、白色だが一部青白いものが混じる |

※網掛け部分は解答不要